ООО "ДельтаМед"
info@deltamedcompany.ru
8(495)432-05-42
8(499)375-34-38

Ранозаживляющие повязки «VitaVallis»

Современные высокоэффективные средства для лечения ран

Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации

Антимикробная резистентность возникает путем мутаций бактерий, при которых бактерии приобретают способность противостоять действию лекарственных препаратов, и применение антибиотика не позволяет подавить инфекцию. За последние 15 лет данная проблема приобрела глобальный масштаб. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в докладе “Antimicrobial Resistance – Global Report on Surveillance 2014”, расходы на лечение инфекций, вызванных резистентными микроорганизмами в Европейском союзе превышают 1,5 млрд евро в год. Правительство США на борьбу с антибиотикоустойчивостью тратит до 10 млрд дол. США в год. По прогнозам ВОЗ, если ситуация не изменится и не будут найдены эффективные решения, к 2050 году смертность по причинам, вызванным антибиотикоустойчивыми микроорганизмами, достигнет 10 млн человек в год.



Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации

В настоящее время Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (ИФПМ СО РАН г.Томск) разработаны инновационные антимикробные сорбционные повязки без химпрепаратов, антибиотиков, гелей и т.д. для лечения ран любой этиологии на разных стадиях раневого процесса. Созданные институтом и производимые Томской компанией ООО «Аквелит» повязки — это новые подходы в борьбе с патогенными микроорганизмами при использовании высокоэффективных антимикробных агентов на основе оксигидроксида алюминия,которые вносят весомый вклад в решение задач, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2045-р «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года».



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2017 г. № 2045-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемую Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия).

2. Минздраву России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 6-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации план мероприятий по реализации Стратегии.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации учитывать в своей деятельности положения Стратегии.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 сентября 2017 г. № 2045-р

СТРАТЕГИЯ
предупреждения распространения антимикробной резистентности
в Российской Федерации на период до 2030 года

I. Общие положения

Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия) является документом, который определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам в Российской Федерации.

Стратегия является основой для организации деятельности и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и иных организаций, принимающих участие в реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным (в том числе к противовирусным противогрибковым и противопаразитарным) препаратам, а также устойчивости микроорганизмов, включая вредные организмы растений, к противомикробным химическим и биологическим средствам, в том числе к пестицидам (далее - антимикробная резистентность).

Стратегия разработана с учетом положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", и Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом

Повязки VitaVallis

Что такое VitaVallis?

VitaVallis – это высокотехнологичные средства нового поколения для лечения ран любой этиологии ,технология запатентована

Состав повязки

- **Нетканый материал из ацетата целлюлозы** (основа)
- **Оксигидроксид алюминия AlOOH** (активные центры с положительным зарядом)
- **Коллоидное серебро 0,001 % масс.** (для подавления роста бактерий внутри повязки)
- **Атравматичная полиамидная сетка**

Перевязочные материалы VitaVallis прошли клинические испытания и сертификацию, необходимые в России, Казахстане, Филиппинах

Принцип действия



Активные центры
AlOOH



Эффект физической сорбции – активные центры с положительным зарядом эффективно сорбируют из раны отрицательно заряженные микроорганизмы, иммобилизуют и подавляют их рост в объеме повязки

Повязки сорбируют Гр(-) и Гр(+) бактерии, включая резистентные к антибиотикам и антисептикам штаммы

Принцип действия

- Действие основано не на химическом, а на физическом (электроположительная сорбция) механизме действия на рану и прилегающие ткани. Активное вещество повязки – это положительно заряженные центры из частиц оксигидроксида алюминия размером 100 нанометров, которые прочно закреплены на матрице из ацетата целлюлозы.
- Клетки внешней мембраны бактерий и вирусов в биологических жидкостях заряжены отрицательно. Вследствие действия разноименных зарядов микроорганизмы удаляются в объем повязки и надежно там удерживаются. Рост микроорганизмов внутри повязки (не в ране) подавляется ионами серебра.
- Мембрана клеток также заряжена отрицательно. Положительный заряд в области раны вызывает активную пролиферацию клеток расположенных по ее периферии и стимулирует регенерацию тканей.
- Активное вещество повязки, активизируя регенерацию, способствует нормальному процессу восстановления тканей и во многих случаях ткань заживает без образования рубцов. Происходит сокращение сроков выздоровления в 1,5 - 2 раза.

8(495)432-05-42
8(499)375-34-38
E-mail: info@deltamedcompany.ru
ДЕЛЬТАMED

Функциональное назначение

Эффективное лечение ран любой этиологии:

- ➢пролежни,
- ➢инфицированные и гнойные раны,
- ➢трофические и диабетические язвы,
- ➢ожоги II-III степени, в т.ч. инфицированные,
- ➢послеоперационные раны с угрозой инфицирования

E-mail: info@deltamedcompany.ru

Преимущества повязок VitaVallis

(по отзывам врачей и пациентов)

- ✓ Сокращение сроков лечения и послеоперационной реабилитации в 1,5-2 раза
- ✓ Глубокое очищение раны (доказанная эффективность сорбции микроорганизмов 99,999%)
- ✓ Высокоэффективны при лечении ран, трудно поддающихся медикаментозному лечению (в т.ч. при непереносимости антибиотиков)
- ✓ Эффективно стимулируют регенерацию тканей, способствуя формированию ткани без грубого рубца
- ✓ Позволяют отказаться от трансплантации кожи при глубоких и обширных ожогах
- ✓ Повышают качество жизни больных со сложными заболеваниями

!По совокупности свойств материал повязок VitaVallis не уступает импортным повязкам с серебром, а по эффективности антимикробного действия и ранозаживляющему эффекту превосходит их

Подтверждение эффективности повязок представлено в научно-технической статье в международном журнале "Раны и раневые инфекции", Главный редактор Митиш В.А.



РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ ЖУРНАЛ ИМ. ПРОФ. Б. М. КОСТЮЧЁНКА
WOUNDS AND WOUND INFECTIONS THE PROF. B. M. KOSTYUCHENOK JOURNAL
ТОМ 7 VOL 7 1 2020

Новый перевязочный материал на основе полимерных микроволокон с оксигидроксидом алюминия: свойства и механизм ранозаживляющего действия

А. С. Ложкомоев[1], Н. В. Кирилова[1, 2], О. В. Бакина[1]
[1]ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН),
Россия, 634055, Томск, пр. Академический, д. 2/4
[2]ООО «Аквелит», Россия, 634055, Томск, пр. Академический, д. 8/8

Контактное лицо: Александр Сергеевич Ложкомоев, asl@ispms.tsc.ru

Цель исследования: исследование структуры нового перевязочного материала VitaVallis и определение механизма его ранозаживляющего действия.

Материалы и методы исследования. Для исследования структуры перевязочного материала VitaVallis были использованы методы просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. Течение раневого процесса изучали на 60 мышах-самцах линии Balb/c. Заживление раневого дефекта под влиянием перевязочного материала изучали на модели «кожного лоскута». Морфометрическую оценку гистологических препаратов проводили методом компьютерного графического анализа образцов. При статистической обработке полученных результатов применили параметрический (критерий Стьюдента) и непараметрический (критерий Вилкоксона) методы. Для анализа использовалась программа Statistica 6.0.

Результаты исследования. Структура перевязочного материала VitaVallis представляет собой хаотично расположенные между собой полимерные волокна диаметром 1,0–5,0 мкм, на поверхности которых иммобилизованы нанолистовые структуры оксигидроксида алюминия (АlOOH). В экспериментах in vivo показано, что применение перевязочного материала VitaVallis при лечении модельных ран у мышей способствует их быстрому заживлению, приводит к более совершенной органотипической дифференцировке образующегося эпидермиса и ускоряет созревание грануляционной ткани. Такой эффект обусловлен совокупностью следующих факторов: снижение воспалительных процессов за счет удаления и удержания раневого экссудата, в том числе патогенной микрофлоры; стимуляция краевой эпителизации; защита формирующейся грануляционной ткани от высыхания и ускорение ее созревания.

Заключение. Анализ структуры и механизма ранозаживляющего действия перевязочного материала VitaVallis позволяет предполагать эффективность его применения в местном лечении ран.

Ключевые слова: рперевязочный материал VitaVallis, лечение ран, полимерные микроволокна, наноструктуный оксигидроксид алюминия, эпителизация.

Для цитирования: Кирилова Н. В., Бакина О. В., Ложкомоев А. С. Новый перевязочный материал на основе полимерных микроволокон с оксигидроксидом алюминия: свойства и механизм ранозаживляющего действия. Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка. 2020; 7(1): ...

DOI: 10.25199/2408-9613-2020-7-1-стр..

Modern dressing based on polymer microfibers with aluminum oxyhydroxide: properties and mechanism of wound healing

A. S. Lozhkomoev[1], N. V. Kirilova[1, 2], O. V. Bakina[1]
[1]Scientific research institution - Institute of Strength Physics and Materials Science of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (ISPMS SB RAS)
2/4 Akademicheskii Ave., Tomsk, 634055, Russia
[2]Aqvelite Company
8/8 Akademicheskii Ave., Tomsk, 634055, Russia

Objective: to investigate the structure of the new VitaVallis dressing and determine the mechanism of its wound healing effect.

Materials and methods. To study the structure of the VitaVallis dressing, transmission and scanning electron microscopy methods were used. The course of the wound process was studied in 60 male mice of the Balb / c line. The healing of a wound defect under the influence of dressings was studied on the model of a "skin flap". Morphometric evaluation of histological preparations was carried out by computer-aided graphical analysis of samples. Statistical processing of the results was carried out using the parametric (Student's test) and non-parametric (Wilcoxon's test) methods. For analysis, the program Statistica 6.0 was used.



Разрешающая документация, поставки

Продукция зарегистрирована в Росздравнадзоре РФ, экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья с 2014 г.
В России поставка в аптечный и госпитальный сектор в 10 регионах.
Мощность производства до 5 млн штук в год.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 июля 2019 года № РЗН 2013/561

На медицинское изделие
Повязки раневые антимикробные сорбционные стерильные по ТУ 9393-002-73745952-2012

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Аквелит" (ООО "Аквелит"), Россия, 634055, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8, помещ. 36

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Аквелит" (ООО "Аквелит"), Россия, 634055, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8, помещ. 36

Место производства медицинского изделия
ООО "Аквелит", Россия, 634055, г. Томск, пр-кт Академический, д. 8/8, помещ. 36

Номер регистрационного досье **№ РД-27967/33088 от 03.07.2019**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2б**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **21.20.24.160**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 15 июля 2019 года № 5247
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0043409

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 июля 2019 года № РЗН 2013/561

Лист 1

На медицинское изделие
Повязки раневые антимикробные сорбционные стерильные по ТУ 9393-002-73745952-2012:
Повязки раневые антимикробные сорбционные стерильные, варианты исполнения:
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения ожоговых ран, размером: 5 см х 5 см, 10 см х 10 см, 10 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения ожоговых ран самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 14 см х 10 см, 15 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения длительно незаживающих ран, размером: 5 см х 5 см, 10 см х 10 см, 10 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для длительно незаживающих ран самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 14 см х 10 см, 15 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения гнойных ран, размером: 5 см х 5 см, 10 см х 10 см, 10 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения гнойных ран самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 14 см х 10 см, 15 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для послеоперационных ран самоклеющаяся, размером 9 см х 5 см, 14 см х 10 см, 15 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения кожных повреждений, размером 5 см х5 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения кожных повреждений самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 9 см х 10 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная вагинальная, диаметром 6 см, толщиной 0,2 см, и 0,3 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная стоматологическая, размером: 2 см х 6 см, 2 см х 10 см, 2 см х1 см.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0058269



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Аквелит» (ООО «Аквелит»)
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принимающих декларацию о соответствии)

Зарегистрированы(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Томской области от 01.02.2005, ОГРН 1057000092335
(сведения о регистрирующем органе или наименование государственного реестра, в котором зарегистрировано юридическое лицо (регистрация, регистрационный номер);

Адрес: 634055, Россия г. Томск, пр. Академический, дом 8/8, пом.36, телефон: +7(3822)571997; +7913113312, почта: info@aquelit.ru
(адрес, телефон, факс)

в лице Директора Кирилловой Натальи Витальевны, действующей на основании Устава
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, основание полномочий представителя)

заявляет: что Изделия раневые антимикробные сорбционные стерильные, варианты исполнения:
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения ожоговых ран, размером: 5 см х 5 см, 10 см х 10 см, 10 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения ожоговых ран самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 14 см х 10 см, 15 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения длительно незаживающих ран, размером: 5 см х 5 см, 10 см х 10 см, 10 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения длительно незаживающих ран самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 14 см х 10 см, 15 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения гнойных ран, размером: 5 см х 5 см, 10 см х 10 см, 10 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для лечения гнойных ран самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 14 см х 10 см, 15 см х 20 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная для соответствующих ран самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 14 см х 10 см, 15 см х 20 см;
- Повязка раневая антисептическая сорбционная стерильная для лечения кожных повреждений, размером: 5 см х 5 см;
- Повязка раневая антисептическая сорбционная стерильная для лечения кожных повреждений самоклеющаяся, размером: 9 см х 5 см, 9 см х 10 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная вагинальная, диаметром 6 см, толщиной 0,2 см, и 0,3 см;
- Повязка раневая антимикробная сорбционная стерильная стоматологическая, размером: 2 см х 6 см, 2 см х 10 см, 2 см х 1 см.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9393-002-73745952-2012
(технические условия, марка, стандарт, на которые выпускаются товары, каталоги)

Серийный выпуск, Код ОКПД 21.20.24.160 Код ТН ВЭД 3005900000
(серийный выпуск, партия, серия, модель, изделие, изделия, партия, серия, модель, изделие, код ОК 005-93 (ОКПД) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН))

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Аквелит» (ООО «Аквелит»)
Адрес: 634055, Россия, г. Томск, пр. Академический, дом 8/8, пом.36
(наименование и полный адрес, страна)

соответствует требованиям ГОСТ 1207-70 (Пп 1.3, 1.8, 1.11), ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2011, ГОСТ ISO 10993-18-2011, ГОСТ Р 52770-2016
(обозначение нормативных документов, требованиям которых соответствует декларируемая продукция, с указанием пунктов этих нормативных документов, нормируемых требований или данных (при наличии))

Декларация принята на основании: Сертификатов о соответствии требованиям стандартов ISO 13485-2003 ЮЗ.ТКШ.001.Б 1248 от 15.12.2018 г. до 16.12.2021 г., выдан Системой добровольной сертификации систем менеджмента "ТК-Стандарт", Рег. РОСС RU. 31580.04ИБ00, Регистрационного удостоверения № РЗН 2013/561 от 15.07.2019, выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (РОСЗДРАВНАДЗОР)
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 25.07.2019

Декларация о соответствии действительна до 24.07.2022 г.

М.П. (подпись) Н.В. Кириллова (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер декларации: RA.RU.11АД57, Орган по сертификации продукции "Кремо Дар" ООО "ИЦ Контроль"
(наименование и адрес органа по сертификации, орган регистрации декларации)

зарегистрирован в РОССИЯ, город Москва, ул. Судейский Вал, д. 9, к. 1, оф. 503
Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.ПР.11АД57.Н.15478/19, от 25.07.2019
(номер регистрации в реестре деклараций о соответствии)

М.П. Гурьева Вера Михайловна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Применение. Ускорение заживления

Больной П 28 лет
Диагноз: Термический ожог 3а степени волосистой части головы

Прогноз: Длительное лечение не менее 180 дней, трансплантация кожного лоскута для закрытия дефекта

День 1.
Оценка состояния раны: обширная рана затылочной области, покрытая некротизированным лоскутом кожи с обильным зловонным гнойным отделяемым с синим прокрашиванием (при микробиологическом исследовании - полирезистентная синегнойная палочка).



День 2.
Оценка состояния раны:
Этапная некрэктомия. Дном раны является затылочная кость.
Перевязка: рана обработана антисептиками.
Наложена повязка ВитаВаллис

8(495)432-05-42
8(499)375-34-38

E-mail: info@deltamedcompany.ru

ДЕЛЬТАMED

Ускорение заживления. Отказ от трансплантации

День 11

Оценка состояния раны: Рана полностью очистилась, активно гранулирует, равномерно сокращается по краям.

Перевязка: Санация раны антисептиками. Наложена повязка ВитаВаллис.



МКЛПМУ Городская больница № 3
Баклаборатория
«____» _____ 20 ____ г.
№ 695
Результаты исследования

Ф.И.О. Безденежных В.П.
Отделение 2 КО
Материал посев из раны

Роста бактериальной микрофлоры НЕ ОБНАРУЖЕНО

	1	2	3		1	2	3		1	2	3
Оксациллин				Цефуроксим				Амикацин			
Пенициллин				Ципрофлоксацин				Хлорамфеникол			
Ампициллин				Цефепим				Ванкомицин			
Цефалотин				Цефтриаксон				Фурагин			
Цефазолин				Эритромицин				Фуродонин			
Цефотаксим				Линкомицин				Азлоциллин			
Цефтазидим				Канамицин				Имипенем			
Цефоперазон				Гентамицин							

S – штамм чувствителен к антибиотику in vitro
I – умеренно-устойчив
R – устойчив

Врач-бактериолог

День 80

Результат: Отказ от трансплантации, ускоренное заживление

8(495)432-05-42
8(499)375-34-38
E-mail: info@deltamedcompany.ru
ДЕЛЬТАMED

Применение. Ускорение заживления

Больной: П 90 лет
Диагноз: Рецидивирующая рожа
Прогноз: Неблагоприятный
Результат: Заживление 95%

До начала лечения

Через 12 суток

8(495)432-05-42
8(499)375-34-38
E-mail: info@deltamedcompany.ru
ДЕЛЬТАMED

Применение. Гинекология.
Медицинский Центр «Феникс», г. Пушкино

Вид повязки - вагинальная, диаметром 6 см, толщиной 0,2/0,3 см.

Основное применение повязок - наложение на влагалищную часть шейки матки после проведения радиоволнового хирургического вмешательства.

Больная А. 24 года

Диагноз: Обширная эрозия шейки матки занимающая половину поверхности

Лечение: Проведена радиоволновая коагуляция эрозированной поверхности.
На шейку матки наложена повязка в виде диска и фиксирована марлевым тампоном.
Смена повязок производилась каждые 24 часа.
На фоне применение повязок отмечено более равномерное отторжение коагуляционного струпа без явлений воспаления подлежащей ткани и сокращение эпителизации на 7 дней по сравнению послеоперационного периода без применения повязок.

8(495)432-05-42
8(499)375-34-38
E-mail: info@deltamedcompany.ru
ДЕЛЬТАMED

Применение. Гинекология.
Медицинский Центр «Феникс», г. Пушкино

Больная Ц. 27 лет

Диагноз: Умеренная дисплазия шейки матки (CIN II), наличие скопления клеток с признаками атипии. Злокачественные клетки не обнаружены.

Лечение: С диагностической и лечебной целью в клинике проведена радиоволновая конизация шейки матки. Проведён местный гемостаз коагуляционным методом. Наложена повязка в виде диска. Первая смена повязки через 48 часов, последующие повязки накладывались каждые 24 часа всего 5 дней.
Отмечено отсутствие кровотечения при отторжении струпа и заживление поверхности без признаков воспаления. Отмечено укорочение периода эпителизации на 8 дней.

Отмечен положительный эффект от использования повязок при герпетическом поражении половых органов и других воспалительных процессах. Происходит быстрое купирование болевых ощущений и отёчности тканей.

Врач высшей категории- гинеколог Махмутов А.Р.

8(495)432-05-42
8(499)375-34-38
E-mail: info@deltamedcompany.ru
ДЕЛЬТАMED

Отзывы

Диагноз: *Пролежень (пациентке 80 лет, инвалид 1 группы)*
Прогноз: *Неблагоприятный*
Результат: *Заживление 95%*

Добрый день! Пожилая женщина лежит уже 7 лет. Развился пролежень. Зав.хирургическим отделением гор.больницы (приезжал - смотрел) сказал, что только в стационаре можно помочь. Но, учитывая строптивый характер и полную не транспортабельность нашей больной, пришлось взяться за эту задачу самим. Перепробовали много что, но ничего не помогало. Нашли повязки Витаваллис. Каждый день благодарила Вас. Практически вокруг основной раны (глубокой с некрозом) все зажило .

Огромная благодарность разработчикам и производителям этих чудодейственных пластырей!
Татьяна Кондакова

Рекомендации по использованию повязок

Универсальный способ

смена повязки 1 раз в сутки

Подходит для неглубоких ран с ровными краями со средней экссудацией. Например, пролежни на стадии мацерации, трофические язвы, медленно заживающие раны (2-3 фаза раневого процесса) смена повязки 1 раз в сутки.

Уход за послеоперационными ранами - смена повязки 1 раз в сутки при наличии экссудата; на чистых сухих ранах допустимо оставлять повязку на срок до 7 дней.

Индивидуальный подход

Раны с сильной экссудацией: в первую фазу раневого процесса необходима смена повязки по мере заполнения экссудатом, примерно 2-3 раза в сутки, далее **1 раз в сутки**.
Важно не оставлять полностью пропитанную повязку на ране дольше 8-12 часов!

Глубокие раны с неровными краями, свищеобразные, «кратерообразные» и т.п.: повязку накладываем с максимальным прилеганием к раневой поверхности, драпируем и тампонируем, предвартель-но сняв сетчатый слой повязки.

!!! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВЯЗКИ ВМЕСТЕ С МАЗЯМИ

Рекомендации по использованию повязок

- ✓ Повязка должна достаточно **плотно прилегать** к раневой поверхности (дну раны). Антимикробная активность повязки и скорость очищения раны будут значительно выше.
- ✓ Под повязку **нельзя ничего наносить** **(мази, кремы, порошки и т.п.)** – это блокирует действие повязки!
- ✓ Повязку **можно вырезать** по контуру и размеру раны.
- ✓ Повязка должна закрывать **края раны с запасом** 1-2 см.
- ✓ Повязки можно применять **на любой стадии** раневого процесса
- ✓ Повязки менять по **мере наполнения**

8(495)432-05-42
8(499)375-34-38
E-mail: info@deltamedcompany.ru
ДЕЛЬТАMED